



Daha Verimli ve Sürdürülebilir Tarım

Bontera Aminoasit, yüksek miktarda amino asit ve peptit içeren organik bir biyostimülatördür. Bitki dokularına transfer edilen Bontera Aminoasit, doğal, biyolojik uyarıcılar olarak etki eder. Abiyotik ve biyotik stres altında bitki iyileşmesini destekler.

Bontera Aminoasit'i aşağıdaki birçok alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz:

- ▶ Tarımsal Ürünler
- ▶ Meyve ve Sebze Bahçeleri
- ▶ Meralar
- ▶ Fidecilik & Çiçekcilik

Bontera Aminoasit'in Faydaları

- ▶ Emzimatik olarak hidrolize edilmiş bitkisel proteinler içerir.
- ▶ Fotosentez ve klorofil oluşumunu destekler.
- ▶ Bitkilerin metabolizmalarını geliştirir.
- ▶ Bitkinin besin alınımını ve ürünün kalitesini destekler.
- ▶ Yüksek viskozitesi nedeniyle bitki yapraklarına çok iyi yapışan organik bir şelatör görevi görür.

Birlikte Uygulama:

Bontera Amino Acid Ultra-Powder kimyasal gübre veya bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Ürün, sulama sisteminde tıkanmalara yol açmaz.

Depolama Ve Saklama:

Kuru ve serin Bontera Amino Acid Ultra-Powder'ı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Kuru ve serin bir yerde saklayınız. Açılmış ürünü bir sonraki kullanıma kadar hava geçirilmeyen bir kapta muhafaza ediniz. Ürün fiziksel ve kimyasal özelliklerini 5 °C ile 30 °C arasında 5 yıl muhafaza eder.

Dikkat!

Çocuklarınızın erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Uyarı:

Bu ürünün uygulama tavsiyesi güvenilir testlere dayanmaktadır. Bu ürünün kullanılmasında, Greenza Turkey açık veya zimni sorumlu değildir. Greenza Turkey, ürünün bahsedilen etkiyi vereceğini hiçbir şekilde garanti etmez. Kullanıcının kullanımından kaynaklı tüm hasar ve zararlardan kullanıcı sorumludur.

UYGULAMA REHBERİ BAKLAGİLLER

1 kg Bontera Amino Acid Ultra-Powder toz formu 10 litre su ile karıştırılarak Bontera Humik Asit konsantré ürün elde edilir, toz konsantré ürün 1kg toz içerik ve 10 litre su ile oluşmaktadır. Konsantré ürün elde ederken veya çözelti ürün haline getirirken kesinlikle şebeke suyu kullanmayınız, klor içerikli su kullanmayınız, kuyu suyu veya kanal sulamaya suyu ile karıştırabilirsiniz. **KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.**

ÜRÜN	VEJETASYON	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA YERİ	UYGULAMA ORANI
	SÜRESİ			
Fasülye, Bakla, Nohut, Mercimek, Bezelye, Soya Fasülyesi ve diğer Baklagiller	2-5 AY	Ekim Dikimden 15 gün sonra		Damlamadan dekara 500 ml. Gelecek şekilde uygulanır. Yapraktan ise 100 lt suya 200 ml. hazırlanan çözelti dekara minimum 100 ml. Düşecek şekilde uygulanır.
		2 Hafta da bir sezon boyunca isteğe göre	Yaprak	Damlamadan dekara 500 ml gelecek şekilde uygulanır. Yapraktan ise 100 lt suya 200 ml hazırlanan çözelti dekara minimum 100 ml Düşecek şekilde uygulanır

📍 Bontera Bursa, Türkiye

🌐 www.bontera.com.tr

☎ +90(224) 502 22 33